

Pic mar
Dendrocopos medius

- Légèrement plus petit qu'un pic épeiche
- Dessus noir taché de blanc, dessous blanc
- Tête blanche à calotte rouge, tache rouge sous la queue
- Forêts vieillissantes, zones bocagères en déprise agricole
- Période de présence: toute l'année
- Période de nidification: avril à juillet



Torcol fourmilier
Jynx torquilla

- De la taille d'un moineau
- Plumage gris clair piqué de brun, plus clair dessous
- Très mimétique sur les troncs
- Bocage
 - Période de présence: mars à août
 - Période de nidification: mai à début août



- Plus petit et plus élancé qu'une tourterelle
- Plumage gris tacheté de clair, plus clair dessous
- Très mimétique sur le sol
- Landes
- Période de présence: mai à septembre
- Période de nidification: mai à août



Engoulevent d'Europe
Caprimulgus europaeus

Conseils d'observation

- munissez-vous de jumelles / soyez discret et silencieux
- privilégiez l'aube ou la soirée pour voir les passereaux, les milieux de journée ensoleillés pour les grands rapaces
- privilégiez la migration post-nuptiale (début août à mi-sept. où les espèces migratrices descendent les gorges de la Truyère parfois en groupes
- participez aux sorties organisées

Points d'observation privilégiés

- Sentier du Fajol et son belvédère (*Campouriez*)
- Village de vallon (*Lacroix-Barrez*)
- Randonnée du Saut du Chien et sa cascade (*Montézic, St-Symphorien-de-Thénières*)
- Randonnée des landes de Mayrinhac (*Taussac*)
- Bois de Baltuergues (*Argences-en-Aubrac*)
- Belvédère du barrage de Sarrans (*Argences-en-Aubrac*)

Bonnes pratiques vis-à-vis de la nature

- **Randonnée**
 - s'éloigner en cas de comportement anormal d'un oiseau: cris d'alarme, fuite, départ du nid
 - ne pas cueillir de fleurs, ni porter atteinte aux espèces animales
 - tenir ses animaux de compagnie en laisse
 - ramasser ses déchets (reste de pique-nique...)
 - ne pas allumer de feu
- **Moto, quad, 4x4**
 - ne pas faire de hors-piste et ne pas traverser les ruisseaux à gué
 - idéalement, éviter les périodes de nidification (avril-juin)
- **Escalade, via-ferrata, canyoning**
 - être discret et silencieux, profitez du calme naturel
 - idéalement, éviter les périodes de nidification (février-juillet)
- **ULM, hélicoptère et autres loisirs aéronautiques**
 - éviter les survols à basse altitude en période de nidification et de migration post-nuptiale de février à septembre

Bonnes pratiques vis-à-vis des usagers

- respecter la propriété (*tous les terrains ont un propriétaire, privé ou public*)
- n'effectuer aucun balisage, ne pas dégrader les balisages ou panneaux d'information en place
- maintenir l'accessibilité aux parcelles agricoles et aux chemins
- adapter sa pratique à celle des autres usagers
- respecter le travail des agriculteurs (clôture, troupeaux...)
- faire preuve de courtoisie et de bienveillance

Plus de renseignements auprès des offices de tourisme ou des mairies.
(Argences-en-Aubrac, Aubrac-Viadène, Pays d'Entraygues|Truyère, Carladez)



La réalisation et l'édition du livret «A vol d'oiseau» sont cofinancées par l'Union Européenne. L'Europe s'engage en Occitanie avec le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural.



Rédaction: SMP du PNR de l'Aubrac, LPO Aveyron, Comité Départemental Olympique et Sportif de l'Aveyron
Crédit Photo couverture: J. Garing / Conception graphique: J. Garing / Conception graphique du PNR de l'Aubrac (J. Garing)

PASSEREAUX



- Légèrement plus petite que l'Alouette des champs
- Mâle et femelle identiques
- Tête et dos brun ou brun-roux, tacheté de crème
- Sourcil clair
- Ventre crème tacheté de brun sur la poitrine
- Milieu ouvert à végétation rase
- Quelques arbres et arbustes
- Chant en vol avec les ailes en «parachute»: lululululululu
- Période de présence: toute l'année
- Période de nidification: avril à juillet

Alouette lulu
Lulula arborea

Pie-grièche écorcheur
Lanius collurio

- De la taille d'un moineau
- Mâle:
 - › coloration très contrastée
 - › tête gris clair marquée d'un large bandeau noir
 - › dos rouge-brunâtre, ventre blanc rosé
- Femelle:
 - › plus terne et mimétique
 - › tête gris clair avec une tache sombre sous l'œil
 - › dos brun-roux, ventre et menton blanc finement tacheté
- Bocage associant pâtures et haies d'épineux
- Période de présence: mai à août
- Période de nidification: avril à juillet



A vol d'oiseau

Natura 2000 • Gorges de la Truyère
Guide d'observation et de bonnes pratiques à emporter partout

Ouvrir entièrement la feuille pour commencer le pliage du livret

RAPACES

- Légèrement plus grand qu'une buse
- Mâle et femelle identiques
- Queue très échancrée, bien visible en vol
- Coloration contrastée: corps roux, tête et dessous de la queue blancs, le tout finement rayé de noir
- Tache blanche sur fond sombre et roux sous les ailes
 - Dessus brun noir
 - Chasse en milieux ouverts (prairie, bocage, etc.)
 - Période de présence: toute l'année
 - Période de nidification: avril à juin



Milan royal
Milvus milvus

Faucon pèlerin
Falco peregrinus

- De la taille d'une corneille
- Mâle semblable à la femelle mais notablement plus petit
- Tête noire et ronde, silhouette compact, trapue
- Ailes pointus, allure générale en fau
- Dessus gris ardoise, dessous blanc finement barré de noir, gorge plus claire
- Falaises, aussi bien utilisées pour la nidification que comme point d'affût pour la chasse
- Période de présence: toute l'année
- Période de nidification: avril à juillet



Aigle botté
Hieraaetus pennatus

- De la taille d'une buse, mais silhouette au vol plus longue, élancée (ailes, queue)
- Mâle et femelle identiques
- Forme claire: ailes noires et blanches, dos brun
- Forme sombre: brun noir avec quelques parties plus claires (dessous des mains et de la queue)
- Chasse dans les espaces ouverts: prairies, landes ...
- Période de présence: avril à septembre
- Période de nidification: avril à août



- Plus grand qu'une buse
- Mâle et femelle identiques
- Dessus brun, tête marron-brune et massive
- Dessous blanc moucheté de brun
- Chasse sur les zones ouvertes et chaudes (landes, pierriers, rocaille) où il trouve les reptiles qui constituent ses proies
- Période de présence: mars à août
- Période de nidification: avril à juillet



Circaète Jean-le-Blanc
Circaetus gallicus

Milan Noir
Circus migrans

- De la taille d'une buse mais plus élancé
- Mâle et femelle identiques
- Queue légèrement échancrée
- Corps et ailes brun sombre, uniforme
- Têtes plus claire, finement striée de noir
- Chasse fréquemment au-dessus des lacs de barrage, ainsi qu'en milieux ouverts (prairies, bocage)
- Période de présence: mars à août
- Période de nidification: avril à juin



- De la taille d'une corneille mais présentant des ailes plus longues
- En vol, profil en V (ailes assez relevées), chasse en vol entre 2 et 5 m du sol
- Mâle: ensemble gris, foncé sur le dessus, plus pâle en dessous / bout des ailes noires
- Femelle: ensemble brun tacheté, foncé que le dessous, plus roux et clair sur le dessous / croupion blanc entre la base du dos et la queue
- Chasse dans les espaces ouverts: prairies, landes, estives...
- Période de présence: toute l'année
- Période de nidification: avril à juillet



Busard Saint-Martin
Circus cyaneus

- De la taille d'une buse
- Mâle et femelle identiques
- Corps et ailes brun sur le dessus, pâle tacheté de brun sur le dessous
- Tête étroite et longue, grisâtre chez le mâle
- Dessous de la queue blanc nettement barré de noir à la base et à l'extrémité
- Paysage varié, alternant bois et prairies, bocage
- Période de présence: avril à août
- Période de nidification: avril à juillet



Bondrée apivore
Pernis apivorus

Grand-duc d'Europe
Bubo bubo

- Le plus grand rapace nocturne du monde
- Chant: hullulement rauque et monotone, portant loin, de décembre à février
- Plumage gris-roux abondamment taché de brun et de noir
- Plus claire sur le dessous des ailes et sur le ventre
- Tête présentant 2 grands yeux orange et 2 aigrettes plumeuses
- Falaises, escarpements rocheux en vallées boisées
- Période de présence: toute l'année
- Période de nidification: avril à juillet

